

## PLERUDIN forte krém

### *Na vonkajšie použitie!*

#### **PLERUDIN Krém na kŕčové žily 50g**

##### **Na vonkajšie použitie!**

**Zloženie:** 50g krému obsahuje: 15g výťažku z nechtíka lekárskeho a 200 antitrombínových jednotiek výťažku z pijavice lekárskej v kréme, zmývateľnom vodou.

Zložky **PLERUDIN krému na kŕčové žily** pôsobia na zmiernenie bolestí a zápalov, uvoľňujú kŕčovitú a bolestivú napätia v oblastiach, postihnutých kŕčovými žilami a v okolí krvných podliatin. Výťažok z pijavice lekárskej pôsobí voči zrážanlivosti krvi a tým urýchľuje vstrebávanie škodlivých usadenín v tkaninách a vstrebávanie sfarbených oblastí, ktoré vznikli v dôsledku krvných podliatin.

##### **Odporúčané oblasti použitia:**

- ✍ Na doplnkové ošetrenie ťažkých a zanedbaných stavov, spôsobených kŕčovými žilami (uzlíkov, vznikajúcich v kŕčových žilách, zapálených rozšírených ciev, fialovo-modrých fľakov, objavujúcich sa na postihnutom mieste, vodnatých opuchov).
- ✍ Na urýchlenie vstrebávania krvných podliatin, bolestivých opuchov a vodnatých opuchov, ktoré vznikajú pri úderoch a natrhnutiach.
- ✍ Na zabránenie obnovenia príznakov pri kŕčových žilách.

##### **Kontraindikácia:**

- ✍ Nenamášať krém na otvorené, krvácajúce rany a na mokvajúce vredy!

##### **Spôsob používania:**

Krém nanesieme denne dvakrát-trikrát na bolestivé, opuchnuté miesto a jemne ho

vmasírujeme do pokožky. Účelné je používať **PLERUDIN krém na kŕčové žily** aj ako obklad: Postihnuté miesto opatrne natrieme krémom v hrúbke cca. 1-2mm a voľne previažeme vlhkým obvazom alebo látkou, a pritom vyššie vyložené nohy necháme aspoň počas doby pôl hodiny jednej hodiny odychovať. (Ak máte problémy s kŕčovými žilami, je vhodné si denne viackrát, aspoň na niekoľko minút vyložiť nohy, aby sa stagnujúca krv ľahšie dostala z rozšírených žíl.) Dlhšie používanie **PLERUDIN krému na kŕčové žily** vo forme liečebných kúr môže byť v trvaní 4-12 týždňov, v závislosti od závažnosti ochorenia kŕčových žíl, a v prípade hematómov 1-3 týždne, v závislosti od veľkosti hematómu.

##### **Vedľajšie účinky:**

Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť reakcie pri individuálnej precitlivelosti (napr. nevymiznúce sčervenanie pokožky). V takom prípade ukončíte ošetrenie.

##### **Upozornenie:**

- ✍ Starostlivo uschovajte pred deťmi!
- ✍ Po použití si dôkladne umyte ruky!

##### **Skladovanie:**

- ✍ Na suchom mieste, pri izbovej teplote (17-25°C).
- ✍ Chrániť pred teplom zo žiarenia (napr. pred slnečnými lúčmi)!

**Výrobca:** IN VITRO Kft., Maďarsko

**Distribúcia:** PINC, s.r.o.

Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno

e-mail: [ajcor@ajcor.sk](mailto:ajcor@ajcor.sk)

[www.ajcor.sk](http://www.ajcor.sk)